



ПАМЯТКА

по профилактике гриппа птиц



Грипп птиц — острое вирусное заболевание птиц, вызывается высокопатогенными вирусами типа H5 и H7. У всех видов домашних и диких водоплавающих птиц характерными клиническими признаками являются:

- | | |
|---|--|
| ✓ нарушение координации движений, | ✓ отказ от корма и воды, угнетенное состояние, |
| ✓ запрокидывание головы, | ✓ у кур резкое снижение яичной продуктивности, |
| ✓ опухание и почернение гребня и серёжек, | ✓ диарея, |
| ✓ отсутствие реакции на внешние раздражители, | ✓ фекалии желто-зеленого цвета. |

Симптомы и течение. Инкубационный период от суток до трех недель. Вирус выделяется в основном с помётом, в результате сам помёт, загрязненные им корма, инвентарь, подстилка, являются основными факторами возбудителя болезни. Основные пути передачи возбудителя болезни - передача возбудителя через корм или воду, при потреблении которого происходят заражение организма птицы, а так же при прямом контакте восприимчивого поголовья с инфицированной птицей – воздушно-капельным путём. Вирус стоек в нейтральной влажной среде, включая воду и в замороженном состоянии, но погибает при нагревании и действии дезинфицирующих средств.

Предварительный диагноз на грипп птиц при возникновении случаев болезни или гибели устанавливается на основании клинических, патологоанатомических и эпизоотологических данных, а **окончательный** по результатам лабораторных исследований патматериала и сывороток крови.

Лечение. Лечение не проводится. Ввиду опасности распространения вируса больную птицу уничтожают.

Рекомендации по профилактике гриппа птиц в благополучных районах.

Ответственность за здоровье, содержание и использование птиц несут их владельцы, которые обязаны:

- ✓ осуществлять хозяйственные ветеринарные мероприятия обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания птиц;
- ✓ предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию птиц для осмотра и вакцинации;
- ✓ извещать ветврачей, обо всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а так же об их необычном поведении;
- ✓ до прибытия ветврачей принять меры по изоляции птиц подозреваемых в заболевании.
- ✓ владельцы птиц обязаны информировать о вновь приобретенных партиях птиц;
- ✓ не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.
- ✓ содержать территории и строения для содержания животных и птицы в чистоте, проводить механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и территории.
- ✓ обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и синантропной птицы (засечивание окон и дверей).
- ✓ осуществлять куплю-продажу только вакцинированной против гриппа домашней и декоративной птицы при наличии ветеринарных сопроводительных документов,

характеризующих территориальное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее выхода и позволяющих идентифицировать птицу.

✓ хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для дикой птицы. Пищевые отходы перед кормлением подвергать кипячению.

✓ убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять на специализированных предприятиях.

В период угрозы возникновения и распространения гриппа птиц:

✓ для предотвращения заражения птицы гриппом в индивидуальных хозяйствах граждан, необходимо всех домашних птиц перевести в режим закрытого содержания.

✓ установить на территориях ЛПХ механические движущиеся конструкции (силуэты хищных птиц), зеркально-механические устройства (блестящие ленты, зеркала, которые, раскачиваясь под действием ветра, дают световые блики, пугающие птиц) и другие средства для отпугивания диких птиц.

✓ осуществлять уход за птицей, уборку помещений и территории в выделенной для этого рабочей одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь).

✓ периодически (2-3 раза в неделю) после механической очистки помещений и инвентаря проводить дезинфекцию.

✓ подвергать дезинфекции и последующей стирке рабочую одежду.

✓ всех вновь поступающих в хозяйство домашних птиц вакцинировать против гриппа птиц, допускать в общее стадо не ранее, чем через 28 суток после вакцинации.

✓ при обнаружении трупов птиц или выявлении больной птицы на улице, в ЛПХ граждан, необходимо незамедлительно сообщить в госветслужбу по месту обнаружения или содержания птиц, в целях проведения необходимых мероприятий по исследованию трупов и больной птицы с целью исключения гриппа птиц.

Профилактика гриппа птиц у людей:

✓ не хранить сырые продукты с готовыми пищевыми продуктами, употреблять для обработки сырых продуктов отдельные кухонные инструменты (ножи, разделочные доски).

✓ избегать контакта с подозрительной в заболевании или павшей птицей.

✓ приобретать для питания мясо птицы, яйцо и другую птицеводческую продукцию в местах санкционированной торговли, требовать вет.сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

✓ употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°C.

✓ исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.).

✓ без крайней надобности не посещать регионы, неблагополучные по гриппу птиц.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа вне зависимости от предполагаемого диагноза **НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ**

в ГБУ РО «Аксайская межрайонная СББЖ»:

Территориальный отдел по Аксайскому району 8-863-50-5-40-99

Территориальный отдел по Багаевскому району 8-863-57-3-31-84

Территориальный отдел по г. Новочеркаску 8-863-52-4-91-43, 24-70-30

или в Администрацию Вашего поселения